


# Профилактика профессионального заражения- зона ответственности медицинских сестер- анестезистов

*Воробьева Ольга Дмитриевна  
ГБУЗ НО «ГКБ№5»  
2023 г.*

**Профилактика профессионального заражения медицинского персонала- это комплекс мероприятий, направленных на четкое соблюдение универсальных мер предосторожности и защиты от инфицирования в случае контакта медицинского работника с любыми биологическими жидкостями при выполнении им профессиональных обязанностей**

# Профессиональный риск инфицирования



## Вероятность заражения при выполнении профессиональных обязанностей

- возникновение условий для передачи инфекции: нарушение СОПов, аварийная ситуация или травма;
- наличие риска передачи возбудителя: учитываются контагиозность возбудителя и доза инфицированного материала;
- определение потенциальной заразности материала, с которым произошёл контакт.

# Основные причины заражения

- невыполнение требований нормативных документов
- отсутствие контроля соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий в МО
- низкий уровень подготовки среднего медицинского персонала

# Организация работы по профилактике

- постоянное **наблюдение и выявление** рисков профессионального заражения на рабочих местах,
- определение **первоочередных задач и характера профилактических мероприятий** с учётом возникающих рисков заражения,
- применение **стандартов безопасности** при выполнении медицинских манипуляций,
- **обеспечение оптимальной рабочей нагрузки** на персонал, анализ случаев профессионального травматизма,
- проведение **экстренной профилактики** при риске профессионального инфицирования,
- **обучение медперсонала** правилам техники безопасности при обращении с травмоопасными инструментами и инфекционными субстратами, включая их обеззараживание и утилизацию.



# СанПиН 3.3686-21



- 3467. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в необходимом количестве и соответствующих размеров (перчатками, масками, очками, щитками, респираторами, фартуками, нарукавниками и другими)
- 3791. Работать в чистой рабочей одежде (операционные костюмы, шапочки, соответствующая обувь или бахилы, надетые в санпропускнике) и стерильных перчатках.

# СанПиН 3.3686-21

- 3464. При проведении манипуляций/операций, сопровождающихся образованием брызг крови, секретов, экскретов, персонал надевает маски, приспособления для защиты глаз (очки, щитки). Предпочтение отдают средствам защиты однократного применения.



# СанПиН 3.3686-21

- 3405. Факторами передачи являются: медицинское оборудование :НДА и ИВЛ;
- 3789. Предотвращение перекрестного инфицирования пациентов через НДА используют ВБФ. Установку и замену фильтров осуществляют в соответствии с инструкцией по применению конкретного фильтра. Съемные детали дезинфицируют.



# СанПиН 3.3686-21



- 3580. МО должны быть обеспечены медицинской техникой и медицинскими изделиями в количестве, достаточном для бесперебойной работы с учетом времени, необходимого для их обработки между манипуляциями у пациентов.

# СанПиН 3.3686-21

- 3868. Инвазивную манипуляцию ВИЧ-инфицированному пациенту предписано выполнять в присутствии второго специалиста, который в случае аварийной ситуации или травмы сможет продолжить её выполнение, а травмированный медицинский работник получить первую медицинскую помощь;
- Аптечка аварийных ситуаций.

# Обучение молодых специалистов



# Заключение

- Исследование ситуаций, проблем, условий работы, связанных с профессиональным заражением должно быть постоянным;
- Организация профилактики напрямую зависит от сестринского персонала;
- Обучение молодых специалистов наиважнейшая задача.





**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**